

表 4345 PD Kt/V 一日透析液使用量(L/日)別（腹膜透析単独患者）

一日透析液使用量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満	1	7	9	5	8	3	5	1	39	67	106	1.01	0.70
(%)	(2.6)	(17.9)	(23.1)	(12.8)	(20.5)	(7.7)	(12.8)	(2.6)	(100.0)				
2～	1	14	56	41	15	8	4	5	144	227	371	0.91	0.59
(%)	(0.7)	(9.7)	(38.9)	(28.5)	(10.4)	(5.6)	(2.8)	(3.5)	(100.0)				
4～	2	40	71	149	113	27	17	14	433	553	986	1.07	0.57
(%)	(0.5)	(9.2)	(16.4)	(34.4)	(26.1)	(6.2)	(3.9)	(3.2)	(100.0)				
6～	3	32	51	148	284	82	55	32	687	806	1,493	1.38	0.69
(%)	(0.4)	(4.7)	(7.4)	(21.5)	(41.3)	(11.9)	(8.0)	(4.7)	(100.0)				
8～	2	15	21	45	183	83	39	13	401	640	1,041	1.51	0.86
(%)	(0.5)	(3.7)	(5.2)	(11.2)	(45.6)	(20.7)	(9.7)	(3.2)	(100.0)				
10～	1	3	3	19	50	30	13	12	131	142	273	1.73	1.22
(%)	(0.8)	(2.3)	(2.3)	(14.5)	(38.2)	(22.9)	(9.9)	(9.2)	(100.0)				
12～		3	2	9	27	13	6	3	63	66	129	1.48	0.52
(%)		(4.8)	(3.2)	(14.3)	(42.9)	(20.6)	(9.5)	(4.8)	(100.0)				
合計	10	114	213	416	680	246	139	80	1,898	2,501	4,399	1.32	0.78
(%)	(0.5)	(6.0)	(11.2)	(21.9)	(35.8)	(13.0)	(7.3)	(4.2)	(100.0)				
記載なし		2	13	13	13	3	1		45	2,744	2,789	1.05	0.43
(%)		(4.4)	(28.9)	(28.9)	(28.9)	(6.7)	(2.2)		(100.0)				
総計	10	116	226	429	693	249	140	80	1,943	5,245	7,188	1.31	0.77
(%)	(0.5)	(6.0)	(11.6)	(22.1)	(35.7)	(12.8)	(7.2)	(4.1)	(100.0)				
平均	5.89	5.47	5.01	5.94	7.11	7.67	7.29	7.19	6.60	6.48	6.53		
標準偏差	2.56	2.41	2.09	2.43	2.39	2.43	3.18	3.07	2.62	2.76	2.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査