

表 4348 PD Kt/V APD使用の有無別（腹膜透析単独患者）

APD使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	7	70	118	225	353	131	71	34	1,009	1,429	2,438	1.27	0.72
(%)	(70.0)	(61.9)	(55.4)	(54.3)	(52.0)	(53.7)	(51.8)	(43.0)	(53.4)	(55.9)	(54.8)		
あり	3	43	95	189	326	113	66	45	880	1,128	2,008	1.37	0.83
(%)	(30.0)	(38.1)	(44.6)	(45.7)	(48.0)	(46.3)	(48.2)	(57.0)	(46.6)	(44.1)	(45.2)		
合計	10	113	213	414	679	244	137	79	1,889	2,557	4,446	1.32	0.78
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明		1		1		1			3	27	30	1.00	0.82
記載なし		2	13	14	14	4	3	1	51	2,661	2,712	1.15	0.51
総計	10	116	226	429	693	249	140	80	1,943	5,245	7,188	1.31	0.77

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査