

表 4356 PD Kt/V 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

| 治療方法 (新分類) | 0.1未満 | 0.1～ | 0.4～ | 0.8～ | 1.2～ | 1.7～ | 2.0～ | 2.4～ | 合計 | 記載なし | 総計 | 平均 | 標準偏差 |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-------|-------|------|------|
| 腹膜透析 (CAPD) (%) | 6 (2.6) | 34 (15.0) | 29 (12.8) | 28 (12.3) | 82 (36.1) | 32 (14.1) | 11 (4.8) | 5 (2.2) | 227 (100.0) | 662 | 889 | 1.16 | 0.72 |
| 腹膜透析 (APD) (%) | 3 (2.6) | 8 (7.0) | 8 (7.0) | 24 (20.9) | 51 (44.3) | 12 (10.4) | 5 (4.3) | 4 (3.5) | 115 (100.0) | 386 | 501 | 1.26 | 0.72 |
| 腹膜透析 (CCPD) (%) | | 5 (5.1) | 6 (6.1) | 17 (17.2) | 39 (39.4) | 23 (23.2) | 7 (7.1) | 2 (2.0) | 99 (100.0) | 259 | 358 | 1.43 | 0.78 |
| 合計 (%) | 9 (2.0) | 47 (10.7) | 43 (9.8) | 69 (15.6) | 172 (39.0) | 67 (15.2) | 23 (5.2) | 11 (2.5) | 441 (100.0) | 1,307 | 1,748 | 1.25 | 0.74 |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 9 (2.0) | 47 (10.7) | 43 (9.8) | 69 (15.6) | 172 (39.0) | 67 (15.2) | 23 (5.2) | 11 (2.5) | 441 (100.0) | 1,307 | 1,748 | 1.25 | 0.74 |

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査