

表 4357 PD Kt/V 併用の状況別 (PD・HD(F)等併用患者)

併用の状況	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
HD(F)単独 (%)													
PD単独 (%)													
HD(F)単独.PDカテ あり (%)													
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	8 (2.2)	28 (7.5)	23 (6.2)	63 (16.9)	160 (43.0)	58 (15.6)	22 (5.9)	10 (2.7)	372 (100.0)	1,172	1,544	1.33	0.74
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	1 (1.8)	19 (33.9)	20 (35.7)	4 (7.1)	8 (14.3)	4 (7.1)			56 (100.0)	85	141	0.64	0.50
PD.HD併用週3 HD(F) (%)													
PD.HD併用週4 HD(F) (%)													
PD.HD併用その他 (%)				2 (15.4)	4 (30.8)	5 (38.5)	1 (7.7)	1 (7.7)	13 (100.0)	50	63	1.58	0.42
合計 (%)	9 (2.0)	47 (10.7)	43 (9.8)	69 (15.6)	172 (39.0)	67 (15.2)	23 (5.2)	11 (2.5)	441 (100.0)	1,307	1,748	1.25	0.74
不明 (%)													
記載なし (%)													
総計 (%)	9 (2.0)	47 (10.7)	43 (9.8)	69 (15.6)	172 (39.0)	67 (15.2)	23 (5.2)	11 (2.5)	441 (100.0)	1,307	1,748	1.25	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査