

表 4362 PD Kt/V 原疾患別 (PD・HD(F)等併用患者)

原疾患	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
慢性糸球体腎炎 (%)	2 (1.0)	22 (11.1)	24 (12.1)	27 (13.6)	80 (40.2)	32 (16.1)	10 (5.0)	2 (1.0)	199 (100.0)	528	727	1.22	0.72
慢性腎盂腎炎 (%)					1 (25.0)	2 (50.0)	1 (25.0)		4 (100.0)	10	14	1.80	0.42
急速進行性糸球 体腎炎 (%)				1 (50.0)		1 (50.0)			2 (100.0)	8	10	1.45	0.49
妊娠腎/妊娠中毒 症 (%)			2 (33.3)		2 (33.3)	1 (16.7)	1 (16.7)		6 (100.0)	4	10	1.25	0.67
その他の分類不能 の腎炎 (%)			1 (25.0)			1 (25.0)	2 (50.0)		4 (100.0)	15	19	1.68	0.81
多発性嚢胞腎 (%)			1 (9.1)	1 (9.1)	5 (45.5)	3 (27.3)	1 (9.1)		11 (100.0)	26	37	1.49	0.43
腎硬化症 (%)	3 (8.3)	2 (5.6)	1 (2.8)	4 (11.1)	15 (41.7)	7 (19.4)	3 (8.3)	1 (2.8)	36 (100.0)	107	143	1.30	0.62
悪性高血圧 (%)		1 (14.3)		2 (28.6)	3 (42.9)	1 (14.3)			7 (100.0)	15	22	1.19	0.53
糖尿病性腎症 (%)	2 (1.6)	21 (16.5)	14 (11.0)	27 (21.3)	46 (36.2)	9 (7.1)	3 (2.4)	5 (3.9)	127 (100.0)	403	530	1.12	0.80
SLE腎炎 (%)					1 (100.0)				1 (100.0)	7	8	1.50	
アミロイド腎 (%)										2	2		
痛風腎 (%)										7	7		
先天性代謝異常に よる腎不全 (%)						1 (100.0)			1 (100.0)		1	1.70	
腎・尿路結核 (%)													
腎・尿路結石 (%)										2	2		
腎・尿路腫瘍 (%)										3	3		
閉塞性尿路障害 (%)						1 (100.0)			1 (100.0)	2	3	1.90	
骨髄腫 (%)										1	1		
腎形成不全 (%)										4	4		
不明 (%)	1 (2.9)	1 (2.9)		4 (11.8)	16 (47.1)	7 (20.6)	2 (5.9)	3 (8.8)	34 (100.0)	116	150	1.61	0.89
再導入 (%)				1 (33.3)	2 (66.7)				3 (100.0)	12	15	1.23	0.25
その他 (%)	1 (20.0)			2 (40.0)	1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)	35	40	1.00	0.62
合計 (%)	9 (2.0)	47 (10.7)	43 (9.8)	69 (15.6)	172 (39.0)	67 (15.2)	23 (5.2)	11 (2.5)	441 (100.0)	1,307	1,748	1.25	0.74
記載なし (%)													
総計 (%)	9 (2.0)	47 (10.7)	43 (9.8)	69 (15.6)	172 (39.0)	67 (15.2)	23 (5.2)	11 (2.5)	441 (100.0)	1,307	1,748	1.25	0.74

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査