

表 4365 PD Kt/V 使用透析液の種類別 (PD・HD(F)等併用患者)

使用透析液の種類	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	1	6	9	11	20	9	6	2	64	120	184	1.23	0.67
(%)	(1.6)	(9.4)	(14.1)	(17.2)	(31.3)	(14.1)	(9.4)	(3.1)	(100.0)				
1.5%液と2.5%液の併用	1	13	16	16	30	14	4	2	96	125	221	1.13	0.79
(%)	(1.0)	(13.5)	(16.7)	(16.7)	(31.3)	(14.6)	(4.2)	(2.1)	(100.0)				
2.5%液のみ		4	3	6	5	2		1	21	30	51	1.19	1.12
(%)		(19.0)	(14.3)	(28.6)	(23.8)	(9.5)		(4.8)	(100.0)				
4.25%液のみ(イコデキストリンなし)					1				1		1	1.50	
(%)					(100.0)				(100.0)				
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)										6	6		
(%)													
1.5%+イコデキストリン	2	4	2	14	50	19	8	3	102	115	217	1.42	0.49
(%)	(2.0)	(3.9)	(2.0)	(13.7)	(49.0)	(18.6)	(7.8)	(2.9)	(100.0)				
1.5%+2.5%+イコデキストリン	1	10	5	8	35	15	4	1	79	114	193	1.33	0.89
(%)	(1.3)	(12.7)	(6.3)	(10.1)	(44.3)	(19.0)	(5.1)	(1.3)	(100.0)				
2.5%+イコデキストリン	4	10	6	8	26	7	1	2	64	81	145	1.11	0.74
(%)	(6.3)	(15.6)	(9.4)	(12.5)	(40.6)	(10.9)	(1.6)	(3.1)	(100.0)				
4.25%液+イコデキストリン										3	3		
(%)													
合計	9	47	41	63	167	66	23	11	427	594	1,021	1.25	0.75
(%)	(2.1)	(11.0)	(9.6)	(14.8)	(39.1)	(15.5)	(5.4)	(2.6)	(100.0)				
不明			2	6	5	1			14	3	17	1.13	0.30
(%)			(14.3)	(42.9)	(35.7)	(7.1)			(100.0)				
記載なし										710	710		
(%)													
総計	9	47	43	69	172	67	23	11	441	1,307	1,748	1.25	0.74
(%)	(2.0)	(10.7)	(9.8)	(15.6)	(39.0)	(15.2)	(5.2)	(2.5)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査