

表 4372 PD Kt/V 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別 (PD・HD(F)等併用患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0 (%)	8 (2.1)	39 (10.3)	35 (9.2)	61 (16.1)	149 (39.2)	57 (15.0)	22 (5.8)	9 (2.4)	380 (100.0)	510	890	1.26	0.74
1.0～ (%)	1 (2.9)	7 (20.6)	4 (11.8)	2 (5.9)	11 (32.4)	7 (20.6)	1 (2.9)	1 (2.9)	34 (100.0)	51	85	1.11	0.65
2.0～ (%)		1 (16.7)	2 (33.3)		3 (50.0)				6 (100.0)	7	13	0.85	0.50
3.0～ (%)				1 (33.3)	1 (33.3)			1 (33.3)	3 (100.0)	2	5	2.57	2.54
4.0～ (%)					1 (100.0)				1 (100.0)	1	2	1.30	
5.0～ (%)					1 (100.0)				1 (100.0)	1	2	1.30	
合計 (%)	9 (2.1)	47 (11.1)	41 (9.6)	64 (15.1)	166 (39.1)	64 (15.1)	23 (5.4)	11 (2.6)	425 (100.0)	572	997	1.25	0.75
記載なし (%)			2 (12.5)	5 (31.3)	6 (37.5)	3 (18.8)			16 (100.0)	735	751	1.22	0.35
総計 (%)	9 (2.0)	47 (10.7)	43 (9.8)	69 (15.6)	172 (39.0)	67 (15.2)	23 (5.2)	11 (2.5)	441 (100.0)	1,307	1,748	1.25	0.74
平均	0.11	0.19	0.20	0.08	0.17	0.11	0.04	0.36	0.15	0.15	0.15		
標準偏差	0.33	0.45	0.51	0.41	0.64	0.31	0.21	0.92	0.52	0.57	0.55		

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査