

表 4381 総透析量 原疾患別（腹膜透析単独患者）

| 原疾患                      | 0.1未満      | 0.1～        | 0.4～        | 0.8～        | 1.2～          | 1.7～          | 2.0～          | 2.4～         | 2.8～         | 合計               | 記載なし  | 総計    | 平均   | 標準偏差 |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|-------|-------|------|------|
| 慢性糸球体腎炎<br>（％）           | 2<br>(0.3) | 7<br>(1.2)  | 17<br>(3.0) | 22<br>(3.8) | 140<br>(24.3) | 173<br>(30.1) | 120<br>(20.9) | 46<br>(8.0)  | 48<br>(8.3)  | 575<br>(100.0)   | 1,754 | 2,329 | 1.93 | 0.99 |
| 慢性腎盂腎炎<br>（％）            |            |             |             |             | 5<br>(27.8)   | 4<br>(22.2)   | 6<br>(33.3)   | 2<br>(11.1)  | 1<br>(5.6)   | 18<br>(100.0)    | 61    | 79    | 1.96 | 0.48 |
| 急速進行性糸球<br>体腎炎<br>（％）    |            |             |             |             | 5<br>(27.8)   | 2<br>(11.1)   | 7<br>(38.9)   | 2<br>(11.1)  | 2<br>(11.1)  | 18<br>(100.0)    | 46    | 64    | 2.38 | 1.48 |
| 妊娠腎/妊娠中毒<br>症<br>（％）     |            |             |             |             | 1<br>(9.1)    |               | 7<br>(63.6)   | 1<br>(9.1)   | 2<br>(18.2)  | 11<br>(100.0)    | 11    | 22    | 2.77 | 2.08 |
| その他の分類不<br>能の腎炎<br>（％）   |            |             |             | 1<br>(4.3)  | 4<br>(17.4)   | 5<br>(21.7)   | 6<br>(26.1)   | 4<br>(17.4)  | 3<br>(13.0)  | 23<br>(100.0)    | 43    | 66    | 2.21 | 0.85 |
| 多発性嚢胞腎<br>（％）            |            | 2<br>(4.3)  | 2<br>(4.3)  |             | 7<br>(15.2)   | 19<br>(41.3)  | 11<br>(23.9)  | 3<br>(6.5)   | 2<br>(4.3)   | 46<br>(100.0)    | 160   | 206   | 1.85 | 0.71 |
| 腎硬化症<br>（％）              |            | 5<br>(2.3)  | 4<br>(1.8)  | 8<br>(3.7)  | 59<br>(26.9)  | 66<br>(30.1)  | 44<br>(20.1)  | 14<br>(6.4)  | 19<br>(8.7)  | 219<br>(100.0)   | 721   | 940   | 1.94 | 1.00 |
| 悪性高血圧<br>（％）             |            |             | 1<br>(5.3)  |             | 4<br>(21.1)   | 10<br>(52.6)  | 1<br>(5.3)    | 1<br>(5.3)   | 2<br>(10.5)  | 19<br>(100.0)    | 66    | 85    | 2.22 | 1.90 |
| 糖尿病性腎症<br>（％）            | 4<br>(0.7) | 11<br>(2.1) | 14<br>(2.6) | 29<br>(5.4) | 130<br>(24.3) | 131<br>(24.4) | 112<br>(20.9) | 61<br>(11.4) | 44<br>(8.2)  | 536<br>(100.0)   | 1,699 | 2,235 | 1.92 | 1.00 |
| SLE腎炎<br>（％）             |            |             | 1<br>(8.3)  |             | 3<br>(25.0)   | 3<br>(25.0)   | 4<br>(33.3)   |              | 1<br>(8.3)   | 12<br>(100.0)    | 42    | 54    | 1.85 | 0.62 |
| アミロイド腎<br>（％）            |            |             |             |             |               | 1<br>(100.0)  |               |              |              | 1<br>(100.0)     | 6     | 7     | 1.90 |      |
| 痛風腎<br>（％）               |            |             | 1<br>(14.3) |             |               | 4<br>(57.1)   |               | 2<br>(28.6)  |              | 7<br>(100.0)     | 19    | 26    | 1.83 | 0.68 |
| 先天性代謝異常<br>による腎不全<br>（％） |            |             | 1<br>(33.3) |             | 2<br>(66.7)   |               |               |              |              | 3<br>(100.0)     | 14    | 17    | 1.23 | 0.38 |
| 腎・尿路結核<br>（％）            |            |             |             |             |               | 1<br>(100.0)  |               |              |              | 1<br>(100.0)     |       | 1     | 1.80 |      |
| 腎・尿路結石<br>（％）            |            |             |             |             |               | 1<br>(100.0)  |               |              |              | 1<br>(100.0)     | 13    | 14    | 1.70 |      |
| 腎・尿路腫瘍<br>（％）            |            |             |             |             |               | 1<br>(50.0)   |               |              | 1<br>(50.0)  | 2<br>(100.0)     | 9     | 11    | 2.40 | 0.99 |
| 閉塞性尿路障害<br>（％）           |            |             |             |             | 1<br>(25.0)   |               | 2<br>(50.0)   |              | 1<br>(25.0)  | 4<br>(100.0)     | 15    | 19    | 2.13 | 0.78 |
| 骨髄腫<br>（％）               |            |             |             |             |               |               |               |              |              |                  | 7     | 7     |      |      |
| 腎形成不全<br>（％）             |            |             | 1<br>(6.7)  |             | 4<br>(26.7)   | 1<br>(6.7)    | 6<br>(40.0)   | 1<br>(6.7)   | 2<br>(13.3)  | 15<br>(100.0)    | 57    | 72    | 1.93 | 0.67 |
| 不明<br>（％）                | 2<br>(1.4) | 6<br>(4.2)  | 3<br>(2.1)  | 9<br>(6.3)  | 34<br>(23.8)  | 35<br>(24.5)  | 35<br>(24.5)  | 10<br>(7.0)  | 9<br>(6.3)   | 143<br>(100.0)   | 546   | 689   | 1.78 | 0.67 |
| 再導入<br>（％）               |            |             |             |             | 5<br>(41.7)   | 6<br>(50.0)   | 1<br>(8.3)    |              |              | 12<br>(100.0)    | 24    | 36    | 1.72 | 0.19 |
| その他<br>（％）               |            | 3<br>(5.5)  |             | 3<br>(5.5)  | 13<br>(23.6)  | 10<br>(18.2)  | 16<br>(29.1)  | 5<br>(9.1)   | 5<br>(9.1)   | 55<br>(100.0)    | 154   | 209   | 1.95 | 0.87 |
| 合計<br>（％）                | 8<br>(0.5) | 34<br>(2.0) | 45<br>(2.6) | 72<br>(4.2) | 417<br>(24.2) | 473<br>(27.5) | 378<br>(22.0) | 152<br>(8.8) | 142<br>(8.3) | 1,721<br>(100.0) | 5,467 | 7,188 | 1.93 | 0.98 |
| 記載なし<br>（％）              |            |             |             |             |               |               |               |              |              |                  |       |       |      |      |
| 総計<br>（％）                | 8<br>(0.5) | 34<br>(2.0) | 45<br>(2.6) | 72<br>(4.2) | 417<br>(24.2) | 473<br>(27.5) | 378<br>(22.0) | 152<br>(8.8) | 142<br>(8.3) | 1,721<br>(100.0) | 5,467 | 7,188 | 1.93 | 0.98 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する％です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査