

表 4388 総透析量 大腿骨頸部骨折の既往別（腹膜透析単独患者）

大腿骨頸部骨折 の既往	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
既往なし （％）	7 (100.0)	26 (100.0)	41 (95.3)	65 (97.0)	362 (98.6)	411 (98.1)	338 (98.0)	137 (96.5)	130 (98.5)	1,517 (98.0)	2,979 (97.1)	4,496 (97.4)	1.95	1.02
既往あり （％）			2 (4.7)	2 (3.0)	5 (1.4)	8 (1.9)	7 (2.0)	5 (3.5)	2 (1.5)	31 (2.0)	88 (2.9)	119 (2.6)	1.87	0.58
合計 （％）	7 (100.0)	26 (100.0)	43 (100.0)	67 (100.0)	367 (100.0)	419 (100.0)	345 (100.0)	142 (100.0)	132 (100.0)	1,548 (100.0)	3,067 (100.0)	4,615 (100.0)	1.95	1.01
不明					4					4	42	46	1.45	0.13
記載なし	1	8	2	5	46	54	33	10	10	169	2,358	2,527	1.77	0.61
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査