

表 4389 総透析量 降圧薬使用の有無別（腹膜透析単独患者）

降圧薬使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	2	5	12	27	54	89	79	26	27	321	691	1,012	1.94	1.09
(%)	(28.6)	(15.6)	(27.3)	(39.1)	(13.6)	(20.0)	(21.7)	(18.1)	(20.6)	(19.7)	(21.3)	(20.8)		
あり	5	27	32	42	342	357	285	118	104	1,312	2,552	3,864	1.92	0.97
(%)	(71.4)	(84.4)	(72.7)	(60.9)	(86.4)	(80.0)	(78.3)	(81.9)	(79.4)	(80.3)	(78.7)	(79.2)		
合計	7	32	44	69	396	446	364	144	131	1,633	3,243	4,876	1.93	0.99
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明			1		4	7	1	1	2	16	35	51	1.89	0.65
記載なし	1	2		3	17	20	13	7	9	72	2,189	2,261	1.93	0.68
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査