

表 4392 総透析量 身長(cm)別 (腹膜透析単独患者)

身長	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
130未満 (%)		1 (6.7)		1 (6.7)		2 (13.3)	3 (20.0)	3 (20.0)	5 (33.3)	15 (100.0)	46	61	2.44	1.04
130～ (%)					1 (50.0)			1 (50.0)		2 (100.0)	9	11	2.00	0.85
135～ (%)		2 (12.5)			2 (12.5)	6 (37.5)	3 (18.8)	2 (12.5)	1 (6.3)	16 (100.0)	46	62	1.95	1.12
140～ (%)		4 (6.6)		2 (3.3)	7 (11.5)	14 (23.0)	19 (31.1)	8 (13.1)	7 (11.5)	61 (100.0)	148	209	2.01	0.79
145～ (%)			4 (3.1)	2 (1.6)	32 (25.2)	29 (22.8)	35 (27.6)	12 (9.4)	13 (10.2)	127 (100.0)	280	407	2.07	1.11
150～ (%)		3 (1.5)	5 (2.5)	7 (3.5)	44 (21.9)	55 (27.4)	47 (23.4)	20 (10.0)	20 (10.0)	201 (100.0)	535	736	1.97	0.79
155～ (%)	1 (0.4)	1 (0.4)	7 (2.5)	12 (4.4)	59 (21.5)	75 (27.3)	70 (25.5)	28 (10.2)	22 (8.0)	275 (100.0)	589	864	1.99	1.06
160～ (%)	1 (0.3)	7 (2.2)	11 (3.4)	16 (5.0)	74 (23.1)	85 (26.6)	68 (21.3)	35 (10.9)	23 (7.2)	320 (100.0)	698	1,018	1.92	1.00
165～ (%)		10 (3.2)	8 (2.6)	12 (3.9)	71 (23.1)	105 (34.1)	58 (18.8)	24 (7.8)	20 (6.5)	308 (100.0)	607	915	1.85	0.83
170～ (%)		5 (2.5)	5 (2.5)	7 (3.5)	56 (27.9)	60 (29.9)	44 (21.9)	9 (4.5)	15 (7.5)	201 (100.0)	435	636	1.93	1.19
175～ (%)			3 (3.7)	6 (7.3)	35 (42.7)	17 (20.7)	12 (14.6)	4 (4.9)	5 (6.1)	82 (100.0)	166	248	1.81	1.06
180～ (%)			1 (4.2)		13 (54.2)	5 (20.8)	3 (12.5)	1 (4.2)	1 (4.2)	24 (100.0)	37	61	1.72	0.54
185～ (%)					1 (100.0)					1 (100.0)	5	6	1.40	
190～ (%)											3	3		
合計 (%)	2 (0.1)	33 (2.0)	44 (2.7)	65 (4.0)	395 (24.2)	453 (27.7)	362 (22.2)	147 (9.0)	132 (8.1)	1,633 (100.0)	3,604	5,237	1.94	0.99
記載なし (%)	6 (6.8)	1 (1.1)	1 (1.1)	7 (8.0)	22 (25.0)	20 (22.7)	16 (18.2)	5 (5.7)	10 (11.4)	88 (100.0)	1,863	1,951	1.75	0.83
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	157.50	157.73	162.27	161.55	162.63	160.92	159.06	157.31	156.95	160.27	159.33	159.63		
標準偏差	3.54	15.05	8.85	9.53	9.82	9.92	11.25	13.50	14.49	11.21	12.45	12.08		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査