

表 4393 総透析量 透析後体重(kg)別（腹膜透析単独患者）

体重	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)						1 (12.5)	2 (25.0)	2 (25.0)	3 (37.5)	8 (100.0)	30	38	2.84	0.81
20～ (%)		2 (25.0)				1 (12.5)		2 (25.0)	3 (37.5)	8 (100.0)	14	22	2.40	1.72
30～ (%)				1 (2.6)	9 (23.1)	11 (28.2)	12 (30.8)	4 (10.3)	2 (5.1)	39 (100.0)	113	152	1.96	0.53
40～ (%)		5 (2.0)	1 (0.4)	7 (2.9)	42 (17.2)	62 (25.4)	71 (29.1)	31 (12.7)	25 (10.2)	244 (100.0)	488	732	2.07	0.91
50～ (%)	1 (0.3)	5 (1.3)	8 (2.0)	8 (2.0)	90 (22.6)	115 (28.9)	95 (23.9)	43 (10.8)	33 (8.3)	398 (100.0)	844	1,242	1.99	0.91
60～ (%)		9 (2.2)	12 (2.9)	14 (3.4)	91 (21.9)	130 (31.3)	91 (21.9)	37 (8.9)	32 (7.7)	416 (100.0)	750	1,166	1.97	1.13
70～ (%)	1 (0.5)	7 (3.2)	3 (1.4)	7 (3.2)	75 (34.7)	61 (28.2)	39 (18.1)	11 (5.1)	12 (5.6)	216 (100.0)	382	598	1.83	1.09
80～ (%)		1 (1.3)	1 (1.3)	5 (6.4)	30 (38.5)	19 (24.4)	14 (17.9)	5 (6.4)	3 (3.8)	78 (100.0)	123	201	1.72	0.51
90～ (%)		1 (3.7)		3 (11.1)	9 (33.3)	4 (14.8)	7 (25.9)	1 (3.7)	2 (7.4)	27 (100.0)	39	66	2.03	1.66
100～ (%)					1 (100.0)					1 (100.0)	11	12	1.40	
110～ (%)				1 (33.3)	2 (66.7)					3 (100.0)	3	6	1.33	0.31
120～ (%)											7	7		
合計 (%)	2 (0.1)	30 (2.1)	25 (1.7)	46 (3.2)	349 (24.3)	404 (28.1)	331 (23.0)	136 (9.5)	115 (8.0)	1,438 (100.0)	2,804	4,242	1.96	1.01
記載なし (%)	6 (2.1)	4 (1.4)	20 (7.1)	26 (9.2)	68 (24.0)	69 (24.4)	47 (16.6)	16 (5.7)	27 (9.5)	283 (100.0)	2,663	2,946	1.74	0.79
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	62.50	60.32	62.41	65.88	63.96	60.57	58.93	57.09	57.21	60.61	59.36	59.79		
標準偏差	14.42	15.62	9.55	16.46	13.67	11.93	12.85	13.24	14.89	13.37	14.23	13.95		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査