

表 4397 総透析量 アルブミン濃度(g/dL)別（腹膜透析単独患者）

アルブミン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5未満 (%)							1 (100.0)			1 (100.0)	11	12	2.00	
1.5～ (%)		1 (5.9)			4 (23.5)	3 (17.6)	6 (35.3)	2 (11.8)	1 (5.9)	17 (100.0)	48	65	1.88	0.62
2.0～ (%)		2 (3.6)	1 (1.8)	4 (7.3)	15 (27.3)	15 (27.3)	12 (21.8)	5 (9.1)	1 (1.8)	55 (100.0)	199	254	1.69	0.56
2.5～ (%)		4 (1.7)	5 (2.2)	10 (4.3)	72 (31.3)	52 (22.6)	50 (21.7)	15 (6.5)	22 (9.6)	230 (100.0)	555	785	1.95	1.09
3.0～ (%)	1 (0.2)	9 (1.6)	8 (1.5)	23 (4.2)	144 (26.1)	155 (28.1)	120 (21.8)	55 (10.0)	36 (6.5)	551 (100.0)	1,040	1,591	1.96	1.10
3.5～ (%)	1 (0.2)	10 (1.8)	14 (2.5)	12 (2.2)	118 (21.2)	174 (31.3)	125 (22.5)	49 (8.8)	53 (9.5)	556 (100.0)	963	1,519	1.98	0.94
4.0～ (%)		4 (3.0)	1 (0.7)		27 (20.0)	42 (31.1)	36 (26.7)	13 (9.6)	12 (8.9)	135 (100.0)	231	366	1.94	0.64
4.5～ (%)					1 (14.3)	3 (42.9)	1 (14.3)	2 (28.6)		7 (100.0)	11	18	1.99	0.43
5.0～ (%)									1 (100.0)	1 (100.0)		1	3.20	
合計 (%)	2 (0.1)	30 (1.9)	29 (1.9)	49 (3.2)	381 (24.5)	444 (28.6)	351 (22.6)	141 (9.1)	126 (8.1)	1,553 (100.0)	3,058	4,611	1.96	0.99
記載なし (%)	6 (3.6)	4 (2.4)	16 (9.5)	23 (13.7)	36 (21.4)	29 (17.3)	27 (16.1)	11 (6.5)	16 (9.5)	168 (100.0)	2,409	2,577	1.66	0.87
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	3.45	3.31	3.37	3.15	3.28	3.40	3.34	3.38	3.41	3.35	3.25	3.28		
標準偏差	0.21	0.59	0.43	0.45	0.51	0.49	0.53	0.52	0.49	0.51	0.55	0.54		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査