

表 4402 総透析量 PTH値(pg/mL)別（腹膜透析単独患者）PTH測定法:whole-PTH

PTH値	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)					3 (23.1)	4 (30.8)	5 (38.5)	1 (7.7)		13 (100.0)	16	29	1.86	0.34
20～ (%)				2 (8.3)	7 (29.2)	8 (33.3)	7 (29.2)			24 (100.0)	10	34	1.69	0.37
35～ (%)			2 (11.1)		7 (38.9)	3 (16.7)	4 (22.2)	2 (11.1)		18 (100.0)	19	37	1.76	0.57
50～ (%)				3 (9.4)	7 (21.9)	8 (25.0)	7 (21.9)	4 (12.5)	3 (9.4)	32 (100.0)	24	56	1.97	0.63
75～ (%)				3 (10.7)	9 (32.1)	7 (25.0)	6 (21.4)	2 (7.1)	1 (3.6)	28 (100.0)	20	48	1.79	0.55
100～ (%)				2 (5.7)	10 (28.6)	9 (25.7)	10 (28.6)	3 (8.6)	1 (2.9)	35 (100.0)	19	54	1.83	0.45
125～ (%)			1 (4.5)	1 (4.5)	6 (27.3)	6 (27.3)	7 (31.8)		1 (4.5)	22 (100.0)	10	32	1.78	0.43
150～ (%)					1 (100.0)					1 (100.0)		1	1.40	
151～ (%)			1 (4.8)	1 (4.8)	3 (14.3)	6 (28.6)	5 (23.8)	2 (9.5)	3 (14.3)	21 (100.0)	11	32	2.07	0.82
180～ (%)			1 (8.3)		5 (41.7)	4 (33.3)	1 (8.3)		1 (8.3)	12 (100.0)	15	27	1.75	0.70
210～ (%)			1 (7.1)		7 (50.0)	4 (28.6)	1 (7.1)	1 (7.1)		14 (100.0)	8	22	1.56	0.48
240～ (%)			1 (10.0)		3 (30.0)	4 (40.0)	1 (10.0)	1 (10.0)		10 (100.0)	10	20	1.64	0.49
300～ (%)				1 (12.5)	2 (25.0)	3 (37.5)	1 (12.5)		1 (12.5)	8 (100.0)	9	17	1.75	0.57
350～ (%)					2 (66.7)	1 (33.3)				3 (100.0)	4	7	1.50	0.26
400～ (%)			1 (16.7)	1 (16.7)	3 (50.0)	1 (16.7)				6 (100.0)	3	9	1.18	0.44
500～ (%)					2 (33.3)	2 (33.3)	2 (33.3)			6 (100.0)	5	11	1.83	0.21
合計 (%)			8 (3.2)	14 (5.5)	77 (30.4)	70 (27.7)	57 (22.5)	16 (6.3)	11 (4.3)	253 (100.0)	183	436	1.79	0.55
記載なし (%)			15 (39.5)	13 (34.2)	5 (13.2)		3 (7.9)	1 (2.6)	1 (2.6)	38 (100.0)	71	109	1.07	0.66
総計 (%)			23 (7.9)	27 (9.3)	82 (28.2)	70 (24.1)	60 (20.6)	17 (5.8)	12 (4.1)	291 (100.0)	254	545	1.70	0.61
平均			198.13	124.64	152.51	144.04	111.23	105.63	136.91	137.12	148.80	142.02		
標準偏差			142.40	113.73	144.25	126.07	105.89	71.38	81.24	123.86	161.12	140.65		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査