

表 4403 総透析量 ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (腹膜透析単独患者)

ヘモグロビン 濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
5未満 (%)											6	6		
5～ (%)					1 (100.0)					1 (100.0)	11	12	1.60	
6～ (%)					3 (60.0)	1 (20.0)	1 (20.0)			5 (100.0)	18	23	1.58	0.30
7～ (%)		1 (6.3)			5 (31.3)	7 (43.8)	2 (12.5)	1 (6.3)		16 (100.0)	78	94	1.68	0.55
8～ (%)		2 (2.6)		2 (2.6)	20 (26.0)	17 (22.1)	22 (28.6)	6 (7.8)	8 (10.4)	77 (100.0)	210	287	1.93	0.58
9～ (%)	1 (0.4)	6 (2.7)	2 (0.9)	9 (4.0)	66 (29.2)	62 (27.4)	49 (21.7)	17 (7.5)	14 (6.2)	226 (100.0)	481	707	1.93	1.10
10～ (%)	1 (0.2)	6 (1.3)	14 (3.0)	12 (2.6)	121 (25.9)	149 (31.8)	94 (20.1)	40 (8.5)	31 (6.6)	468 (100.0)	862	1,330	1.94	1.08
11～ (%)		12 (2.5)	6 (1.2)	15 (3.1)	110 (22.5)	144 (29.5)	110 (22.5)	52 (10.7)	39 (8.0)	488 (100.0)	827	1,315	1.98	0.98
12～ (%)		2 (1.0)	4 (2.1)	8 (4.1)	43 (22.3)	45 (23.3)	54 (28.0)	13 (6.7)	24 (12.4)	193 (100.0)	403	596	2.00	0.88
13～ (%)		1 (1.6)	2 (3.3)	2 (3.3)	11 (18.0)	15 (24.6)	15 (24.6)	10 (16.4)	5 (8.2)	61 (100.0)	126	187	1.93	0.62
14～ (%)			1 (7.1)	1 (7.1)	2 (14.3)	3 (21.4)	3 (21.4)	1 (7.1)	3 (21.4)	14 (100.0)	46	60	2.09	1.09
合計 (%)	2 (0.1)	30 (1.9)	29 (1.9)	49 (3.2)	382 (24.7)	443 (28.6)	350 (22.6)	140 (9.0)	124 (8.0)	1,549 (100.0)	3,068	4,617	1.95	0.99
記載なし (%)	6 (3.5)	4 (2.3)	16 (9.3)	23 (13.4)	35 (20.3)	30 (17.4)	28 (16.3)	12 (7.0)	18 (10.5)	172 (100.0)	2,399	2,571	1.68	0.88
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	9.85	10.63	11.24	11.07	10.71	10.84	10.92	11.03	11.15	10.88	10.74	10.79		
標準偏差	0.92	1.31	1.13	1.24	1.31	1.20	1.30	1.18	1.41	1.27	1.50	1.43		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査