

表 4404 総透析量 総コレステロール濃度(mg/dL)別（腹膜透析単独患者）

総コレステロール濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
100未満 (%)				2 (18.2)	1 (9.1)	5 (45.5)	3 (27.3)			11 (100.0)	22	33	1.73	0.45
100～ (%)				3 (8.3)	7 (19.4)	10 (27.8)	7 (19.4)	7 (19.4)	2 (5.6)	36 (100.0)	65	101	2.19	1.60
120～ (%)		4 (3.6)	3 (2.7)	6 (5.4)	35 (31.5)	20 (18.0)	27 (24.3)	9 (8.1)	7 (6.3)	111 (100.0)	169	280	1.85	1.14
140～ (%)		5 (2.4)	5 (2.4)	6 (2.9)	52 (25.4)	62 (30.2)	40 (19.5)	15 (7.3)	20 (9.8)	205 (100.0)	352	557	2.00	1.20
160～ (%)	1 (0.4)	5 (2.1)	3 (1.3)	5 (2.1)	64 (27.0)	70 (29.5)	57 (24.1)	17 (7.2)	15 (6.3)	237 (100.0)	397	634	1.93	1.11
180～ (%)		6 (2.2)	4 (1.5)	6 (2.2)	60 (22.1)	97 (35.7)	56 (20.6)	25 (9.2)	18 (6.6)	272 (100.0)	406	678	1.94	0.92
200～ (%)		3 (1.7)	4 (2.3)	7 (4.0)	44 (24.9)	48 (27.1)	35 (19.8)	20 (11.3)	16 (9.0)	177 (100.0)	286	463	1.95	0.88
220～ (%)		1 (1.1)	4 (4.6)	1 (1.1)	21 (24.1)	29 (33.3)	20 (23.0)	5 (5.7)	6 (6.9)	87 (100.0)	184	271	1.93	0.96
240～ (%)		1 (2.5)			6 (15.0)	10 (25.0)	9 (22.5)	8 (20.0)	6 (15.0)	40 (100.0)	96	136	2.32	1.36
260～ (%)			1 (1.9)	2 (3.8)	12 (23.1)	12 (23.1)	9 (17.3)	10 (19.2)	6 (11.5)	52 (100.0)	88	140	2.05	0.71
合計 (%)	1 (0.1)	25 (2.0)	24 (2.0)	38 (3.1)	302 (24.6)	363 (29.6)	263 (21.4)	116 (9.4)	96 (7.8)	1,228 (100.0)	2,065	3,293	1.96	1.06
記載なし (%)	7 (1.4)	9 (1.8)	21 (4.3)	34 (6.9)	115 (23.3)	110 (22.3)	115 (23.3)	36 (7.3)	46 (9.3)	493 (100.0)	3,402	3,895	1.83	0.74
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	162.00	174.96	183.75	169.08	180.59	184.08	180.49	189.46	188.51	182.63	183.64	183.26		
標準偏差		31.41	37.83	46.31	39.99	40.94	37.80	48.08	44.79	41.13	41.38	41.29		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査