

表 4405 総透析量 HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析単独患者）

HDL-C濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
20未満 (%)		1 (50.0)			1 (50.0)					2 (100.0)	4	6	0.70	0.85
20～ (%)		2 (2.8)	1 (1.4)	4 (5.6)	28 (39.4)	16 (22.5)	16 (22.5)	1 (1.4)	3 (4.2)	71 (100.0)	101	172	1.69	0.52
30～ (%)	1 (0.4)	3 (1.3)	2 (0.8)	5 (2.1)	64 (26.9)	71 (29.8)	53 (22.3)	27 (11.3)	12 (5.0)	238 (100.0)	433	671	1.93	0.82
40～ (%)		1 (0.3)	10 (3.2)	12 (3.9)	78 (25.3)	97 (31.5)	64 (20.8)	25 (8.1)	21 (6.8)	308 (100.0)	452	760	1.94	1.15
50～ (%)		2 (0.8)	5 (1.9)	8 (3.1)	52 (19.9)	81 (31.0)	62 (23.8)	19 (7.3)	32 (12.3)	261 (100.0)	398	659	2.12	1.28
60～ (%)		2 (1.1)	2 (1.1)	5 (2.8)	44 (24.6)	47 (26.3)	43 (24.0)	14 (7.8)	22 (12.3)	179 (100.0)	239	418	2.07	1.10
70～ (%)		1 (1.1)	1 (1.1)	2 (2.3)	20 (23.0)	26 (29.9)	21 (24.1)	12 (13.8)	4 (4.6)	87 (100.0)	136	223	1.99	0.91
80～ (%)					6 (15.8)	11 (28.9)	14 (36.8)	6 (15.8)	1 (2.6)	38 (100.0)	73	111	2.03	0.35
90～ (%)					3 (14.3)	5 (23.8)	4 (19.0)	7 (33.3)	2 (9.5)	21 (100.0)	33	54	2.25	0.61
100～ (%)			1 (6.3)	1 (6.3)	4 (25.0)	4 (25.0)	2 (12.5)	2 (12.5)	2 (12.5)	16 (100.0)	30	46	1.93	0.80
合計 (%)	1 (0.1)	12 (1.0)	22 (1.8)	37 (3.0)	300 (24.6)	358 (29.3)	279 (22.9)	113 (9.3)	99 (8.1)	1,221 (100.0)	1,899	3,120	1.99	1.05
記載なし (%)	7 (1.4)	22 (4.4)	23 (4.6)	35 (7.0)	117 (23.4)	115 (23.0)	99 (19.8)	39 (7.8)	43 (8.6)	500 (100.0)	3,568	4,068	1.77	0.77
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	32.00	42.67	51.27	48.38	49.08	51.51	52.27	55.82	55.34	51.59	51.46	51.51		
標準偏差		18.28	18.34	16.31	16.91	16.95	16.64	20.73	18.99	17.55	17.92	17.78		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査