

表 4406 総透析量 Non-HDL-C濃度(mg/dL)別（腹膜透析単独患者）

Non-HDL-C濃度	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
50未満 (%)				1 (12.5)	1 (12.5)	3 (37.5)	1 (12.5)	2 (25.0)		8 (100.0)	4	12	1.91	0.53
50～ (%)				2 (6.3)	8 (25.0)	7 (21.9)	7 (21.9)	4 (12.5)	4 (12.5)	32 (100.0)	44	76	2.33	1.74
70～ (%)			2 (2.2)	7 (7.5)	17 (18.3)	27 (29.0)	24 (25.8)	8 (8.6)	8 (8.6)	93 (100.0)	148	241	2.01	1.18
90～ (%)		1 (0.6)	5 (2.8)	2 (1.1)	51 (29.0)	45 (25.6)	35 (19.9)	18 (10.2)	19 (10.8)	176 (100.0)	277	453	2.08	1.26
110～ (%)		2 (0.8)	2 (0.8)	6 (2.5)	65 (26.7)	76 (31.3)	55 (22.6)	18 (7.4)	19 (7.8)	243 (100.0)	353	596	2.01	1.20
130～ (%)	1 (0.4)	2 (0.9)	3 (1.3)	8 (3.6)	61 (27.2)	72 (32.1)	48 (21.4)	16 (7.1)	13 (5.8)	224 (100.0)	298	522	1.88	0.80
150～ (%)		3 (2.1)	3 (2.1)	1 (0.7)	33 (23.2)	40 (28.2)	36 (25.4)	17 (12.0)	9 (6.3)	142 (100.0)	212	354	2.00	1.07
170～ (%)		2 (2.2)	2 (2.2)	2 (2.2)	19 (21.3)	33 (37.1)	16 (18.0)	10 (11.2)	5 (5.6)	89 (100.0)	124	213	1.86	0.55
190～ (%)			1 (3.3)	2 (6.7)	6 (20.0)	7 (23.3)	6 (20.0)	5 (16.7)	3 (10.0)	30 (100.0)	72	102	2.20	1.54
210～ (%)				1 (3.7)	6 (22.2)	9 (33.3)	3 (11.1)	3 (11.1)	5 (18.5)	27 (100.0)	56	83	2.12	0.78
合計 (%)	1 (0.1)	10 (0.9)	18 (1.7)	32 (3.0)	267 (25.1)	319 (30.0)	231 (21.7)	101 (9.5)	85 (8.0)	1,064 (100.0)	1,588	2,652	2.00	1.09
記載なし (%)	7 (1.1)	24 (3.7)	27 (4.1)	40 (6.1)	150 (22.8)	154 (23.4)	147 (22.4)	51 (7.8)	57 (8.7)	657 (100.0)	3,879	4,536	1.81	0.74
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	130.00	141.00	132.06	122.09	130.32	132.57	127.87	131.67	128.60	130.33	132.08	131.38		
標準偏差		27.45	35.11	46.87	37.13	39.15	33.66	40.63	42.47	37.99	39.30	38.78		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査