

表 4411 総透析量 使用透析液の種類別（腹膜透析単独患者）

使用透析液の種類	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
1.5%液のみ	3	13	22	30	144	209	188	78	68	755	1,336	2,091	1.95	0.89
(%)	(0.4)	(1.7)	(2.9)	(4.0)	(19.1)	(27.7)	(24.9)	(10.3)	(9.0)	(100.0)				
1.5%液と2.5%液の併用	1	7	3	7	56	62	34	20	12	202	363	565	1.95	1.24
(%)	(0.5)	(3.5)	(1.5)	(3.5)	(27.7)	(30.7)	(16.8)	(9.9)	(5.9)	(100.0)				
2.5%液のみ		1	2	4	11	5	7	1	5	36	90	126	1.76	0.72
(%)		(2.8)	(5.6)	(11.1)	(30.6)	(13.9)	(19.4)	(2.8)	(13.9)	(100.0)				
4.25%液のみ(イコデキストリンなし)						1	1			2	5	7	2.00	0.14
(%)						(50.0)	(50.0)			(100.0)				
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)					2	5	5	1	3	16	35	51	2.34	0.97
(%)					(12.5)	(31.3)	(31.3)	(6.3)	(18.8)	(100.0)				
1.5%+イコデキストリン	4	5	7	15	105	92	88	35	34	385	620	1,005	1.92	0.90
(%)	(1.0)	(1.3)	(1.8)	(3.9)	(27.3)	(23.9)	(22.9)	(9.1)	(8.8)	(100.0)				
1.5%+2.5%+イコデキストリン		6	8	6	47	56	31	9	15	178	188	366	1.96	1.40
(%)		(3.4)	(4.5)	(3.4)	(26.4)	(31.5)	(17.4)	(5.1)	(8.4)	(100.0)				
2.5%+イコデキストリン		1	3	8	40	28	19	6		105	189	294	1.65	0.47
(%)		(1.0)	(2.9)	(7.6)	(38.1)	(26.7)	(18.1)	(5.7)		(100.0)				
4.25%液+イコデキストリン									1	1	2	3	3.90	
(%)									(100.0)	(100.0)				
合計	8	33	45	70	405	458	373	150	138	1,680	2,828	4,508	1.93	0.99
(%)	(0.5)	(2.0)	(2.7)	(4.2)	(24.1)	(27.3)	(22.2)	(8.9)	(8.2)	(100.0)				
不明				2	9	13	4	2	4	34	14	48	1.91	0.53
(%)				(5.9)	(26.5)	(38.2)	(11.8)	(5.9)	(11.8)	(100.0)				
記載なし		1			3	2	1			7	2,625	2,632	1.56	0.62
(%)		(14.3)			(42.9)	(28.6)	(14.3)			(100.0)				
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98
(%)	(0.5)	(2.0)	(2.6)	(4.2)	(24.2)	(27.5)	(22.0)	(8.8)	(8.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査