

表 4412 総透析量 一日透析液使用量(L/日)別（腹膜透析単独患者）

一日透析液使用量	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
2未満 (%)		1 (2.9)		3 (8.6)	6 (17.1)	4 (11.4)	12 (34.3)	4 (11.4)	5 (14.3)	35 (100.0)	71	106	2.13	0.96
2～ (%)	1 (0.8)	3 (2.3)	1 (0.8)	9 (7.0)	33 (25.8)	33 (25.8)	25 (19.5)	9 (7.0)	14 (10.9)	128 (100.0)	243	371	1.87	0.74
4～ (%)	2 (0.5)	5 (1.3)	16 (4.3)	24 (6.4)	88 (23.5)	100 (26.7)	77 (20.5)	33 (8.8)	30 (8.0)	375 (100.0)	611	986	1.86	0.80
6～ (%)	2 (0.3)	11 (1.8)	16 (2.7)	22 (3.7)	144 (23.9)	166 (27.6)	131 (21.8)	54 (9.0)	56 (9.3)	602 (100.0)	891	1,493	1.95	0.98
8～ (%)	2 (0.5)	7 (1.9)	10 (2.7)	6 (1.6)	84 (23.0)	113 (30.9)	87 (23.8)	38 (10.4)	19 (5.2)	366 (100.0)	675	1,041	1.97	1.17
10～ (%)	1 (0.8)	2 (1.7)	1 (0.8)	5 (4.2)	33 (27.7)	30 (25.2)	27 (22.7)	10 (8.4)	10 (8.4)	119 (100.0)	154	273	2.05	1.25
12～ (%)		3 (5.3)	1 (1.8)	2 (3.5)	19 (33.3)	14 (24.6)	12 (21.1)	2 (3.5)	4 (7.0)	57 (100.0)	72	129	1.75	0.63
合計 (%)	8 (0.5)	32 (1.9)	45 (2.7)	71 (4.2)	407 (24.2)	460 (27.3)	371 (22.1)	150 (8.9)	138 (8.2)	1,682 (100.0)	2,717	4,399	1.93	0.99
記載なし (%)		2 (5.1)		1 (2.6)	10 (25.6)	13 (33.3)	7 (17.9)	2 (5.1)	4 (10.3)	39 (100.0)	2,750	2,789	1.85	0.60
総計 (%)	8 (0.5)	34 (2.0)	45 (2.6)	72 (4.2)	417 (24.2)	473 (27.5)	378 (22.0)	152 (8.8)	142 (8.3)	1,721 (100.0)	5,467	7,188	1.93	0.98
平均	6.49	6.87	6.25	5.77	6.77	6.74	6.73	6.54	6.27	6.63	6.47	6.53		
標準偏差	2.14	2.91	1.97	2.49	2.53	2.56	3.06	2.26	2.76	2.66	2.73	2.70		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査