

表 4415 総透析量 APD使用の有無別（腹膜透析単独患者）

APD使用の有無	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
なし	5	15	29	37	220	259	186	70	69	890	1,548	2,438	1.88	0.89
(%)	(62.5)	(45.5)	(64.4)	(52.9)	(54.3)	(56.9)	(50.3)	(47.0)	(50.0)	(53.2)	(55.8)	(54.8)		
あり	3	18	16	33	185	196	184	79	69	783	1,225	2,008	1.98	1.09
(%)	(37.5)	(54.5)	(35.6)	(47.1)	(45.7)	(43.1)	(49.7)	(53.0)	(50.0)	(46.8)	(44.2)	(45.2)		
合計	8	33	45	70	405	455	370	149	138	1,673	2,773	4,446	1.93	0.99
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		
不明				1		1		1		3	27	30	1.87	0.75
記載なし		1		1	12	17	8	2	4	45	2,667	2,712	1.86	0.53
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査