

表 4417 総透析量 PD透析液交換方法別（腹膜透析単独患者）

PD透析液交換方法	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
完全手動式	2	21	23	25	142	172	130	50	39	604	818	1,422	1.81	0.69
(%)	(0.3)	(3.5)	(3.8)	(4.1)	(23.5)	(28.5)	(21.5)	(8.3)	(6.5)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(紫外線)	6	9	17	32	204	233	184	70	72	827	1,495	2,322	1.98	1.10
(%)	(0.7)	(1.1)	(2.1)	(3.9)	(24.7)	(28.2)	(22.2)	(8.5)	(8.7)	(100.0)				
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)		2	2	12	53	50	56	26	27	228	379	607	2.09	1.17
(%)		(0.9)	(0.9)	(5.3)	(23.2)	(21.9)	(24.6)	(11.4)	(11.8)	(100.0)				
バッグ交換デバイス (左記以外、半手動も含む)		2	3	1	4	2	4	3		19	47	66	1.53	0.78
(%)		(10.5)	(15.8)	(5.3)	(21.1)	(10.5)	(21.1)	(15.8)		(100.0)				
合計	8	34	45	70	403	457	374	149	138	1,678	2,739	4,417	1.93	0.99
(%)	(0.5)	(2.0)	(2.7)	(4.2)	(24.0)	(27.2)	(22.3)	(8.9)	(8.2)	(100.0)				
不明				2	11	12	4	3	4	36	40	76	1.89	0.55
(%)				(5.6)	(30.6)	(33.3)	(11.1)	(8.3)	(11.1)	(100.0)				
記載なし					3	4				7	2,688	2,695	1.61	0.29
(%)					(42.9)	(57.1)				(100.0)				
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98
(%)	(0.5)	(2.0)	(2.6)	(4.2)	(24.2)	(27.5)	(22.0)	(8.8)	(8.3)	(100.0)				

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査