

表 4418 総透析量 2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)別(腹膜透析単独患者)

2014年中の腹膜炎発症率(回/1患者・年)	0.1未満	0.1～	0.4～	0.8～	1.2～	1.7～	2.0～	2.4～	2.8～	合計	記載なし	総計	平均	標準偏差
0	6	26	39	60	358	402	331	133	119	1,474	2,284	3,758	1.93	0.99
(%)	(0.4)	(1.8)	(2.6)	(4.1)	(24.3)	(27.3)	(22.5)	(9.0)	(8.1)	(100.0)				
1.0～	1	5	3	5	39	46	28	12	13	152	248	400	1.92	1.01
(%)	(0.7)	(3.3)	(2.0)	(3.3)	(25.7)	(30.3)	(18.4)	(7.9)	(8.6)	(100.0)				
2.0～	1		1	2	4	6	5	1	4	24	58	82	1.88	0.81
(%)	(4.2)		(4.2)	(8.3)	(16.7)	(25.0)	(20.8)	(4.2)	(16.7)	(100.0)				
3.0～		1	1				2			4	21	25	1.30	0.99
(%)		(25.0)	(25.0)				(50.0)			(100.0)				
4.0～				2		2	2			6	7	13	1.65	0.54
(%)				(33.3)		(33.3)	(33.3)			(100.0)				
5.0～						1	1	4	1	7	16	23	2.53	0.44
(%)						(14.3)	(14.3)	(57.1)	(14.3)	(100.0)				
合計	8	32	44	69	401	457	369	150	137	1,667	2,634	4,301	1.93	0.99
(%)	(0.5)	(1.9)	(2.6)	(4.1)	(24.1)	(27.4)	(22.1)	(9.0)	(8.2)	(100.0)				
不明記載なし		2	1	3	16	16	9	2	5	54	2,833	2,887	1.79	0.60
(%)		(3.7)	(1.9)	(5.6)	(29.6)	(29.6)	(16.7)	(3.7)	(9.3)	(100.0)				
総計	8	34	45	72	417	473	378	152	142	1,721	5,467	7,188	1.93	0.98
(%)	(0.5)	(2.0)	(2.6)	(4.2)	(24.2)	(27.5)	(22.0)	(8.8)	(8.3)	(100.0)				
平均	0.38	0.25	0.18	0.26	0.12	0.18	0.16	0.29	0.20	0.18	0.23	0.21		
標準偏差	0.74	0.62	0.58	0.81	0.37	0.72	0.56	1.31	0.67	0.70	0.85	0.79		

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*個々の患者の腹膜炎発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査