

表 4422 腹膜炎罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,502 (87.0)	301 (10.5)	48 (1.7)	19 (0.7)	3 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)			1 (0.0)	2,876 (100.0)	43	2,102	5,021
腹膜透析 (APD) (%)	1,521 (89.0)	155 (9.1)	19 (1.1)	7 (0.4)	3 (0.2)	3 (0.2)			1 (0.1)		1,709 (100.0)	30	1,100	2,839
腹膜透析 (CCPD) (%)	628 (87.7)	71 (9.9)	15 (2.1)	1 (0.1)	1 (0.1)						716 (100.0)	6	359	1,081
合計 (%)	4,651 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,301 (100.0)	79	3,561	8,941
記載なし (%)														
総計 (%)	4,651 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,301 (100.0)	79	3,561	8,941

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査