

表 4423 腹膜炎罹患回数(回/年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
HD(F)単独 (%)														
PD単独 (%)	3,758 (87.4)	440 (10.2)	70 (1.6)	22 (0.5)	6 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)			1 (0.0)	4,301 (100.0)	60	2,827	7,188
HD(F)単独.PDカテ あり (%)														
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	763 (90.0)	69 (8.1)	8 (0.9)	5 (0.6)	1 (0.1)	1 (0.1)				1 (0.1)	848 (100.0)	19	677	1,544
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	89 (86.4)	12 (11.7)	2 (1.9)								103 (100.0)		38	141
PD.HD併用週3 HD(F) (%)														
PD.HD併用週4 HD(F) (%)														
PD.HD併用その他 (%)	38 (82.6)	6 (13.0)	2 (4.3)								46 (100.0)		17	63
合計 (%)	4,648 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)			1 (0.0)	5,298 (100.0)	79	3,559	8,936
不明 (%)	3 (100.0)										3 (100.0)		2	5
記載なし (%)														
総計 (%)	4,651 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)			1 (0.0)	5,301 (100.0)	79	3,561	8,941

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査