

表 4435 腹膜炎罹患回数(回/年) 大腿骨頸部骨折の既往別（腹膜透析患者）

大腿骨頸部骨折 の既往	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
既往なし (%)	4,060 (98.2)	456 (97.4)	70 (97.2)	24 (100.0)	7 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)		1 (100.0)	1 (100.0)	4,624 (98.1)	50 (98.0)	1,057 (96.0)	5,731 (97.7)
既往あり (%)	75 (1.8)	12 (2.6)	2 (2.8)								89 (1.9)	1 (2.0)	44 (4.0)	134 (2.3)
合計 (%)	4,135 (100.0)	468 (100.0)	72 (100.0)	24 (100.0)	7 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)		1 (100.0)	1 (100.0)	4,713 (100.0)	51 (100.0)	1,101 (100.0)	5,865 (100.0)
不明	35	4	1								40	1	14	55
記載なし	481	55	9	3							548	27	2,446	3,021
総計	4,651	527	82	27	7	4	1		1	1	5,301	79	3,561	8,941

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査