

表 4436 腹膜炎罹患回数(回/年) 降圧薬使用の有無別（腹膜透析患者）

| 降圧薬使用の有無 | なし      | 1回      | 2回      | 3回      | 4回      | 5回      | 6回      | 7回 | 8回      | 9回以上    | 合計      | 不明      | 記載なし    | 総計      |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| なし       | 894     | 98      | 20      | 6       |         | 1       | 1       |    |         |         | 1,020   | 12      | 255     | 1,287   |
| (%)      | (20.5)  | (19.7)  | (27.4)  | (23.1)  |         | (25.0)  | (100.0) |    |         |         | (20.5)  | (50.0)  | (21.6)  | (20.8)  |
| あり       | 3,472   | 399     | 53      | 20      | 7       | 3       |         |    | 1       | 1       | 3,956   | 12      | 924     | 4,892   |
| (%)      | (79.5)  | (80.3)  | (72.6)  | (76.9)  | (100.0) | (75.0)  |         |    | (100.0) | (100.0) | (79.5)  | (50.0)  | (78.4)  | (79.2)  |
| 合計       | 4,366   | 497     | 73      | 26      | 7       | 4       | 1       |    | 1       | 1       | 4,976   | 24      | 1,179   | 6,179   |
| (%)      | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) |    | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) | (100.0) |
| 不明       | 22      | 4       | 3       |         |         |         |         |    |         |         | 29      | 27      | 15      | 71      |
| 記載なし     | 263     | 26      | 6       | 1       |         |         |         |    |         |         | 296     | 28      | 2,367   | 2,691   |
| 総計       | 4,651   | 527     | 82      | 27      | 7       | 4       | 1       |    | 1       | 1       | 5,301   | 79      | 3,561   | 8,941   |

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。  
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy  
2014年調査