

表 4443 腹膜炎罹患回数(回/年) クレアチニン濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

クレアチニン 濃度	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
2未満 (%)	11 (100.0)										11 (100.0)		6	17
2～ (%)	103 (89.6)	10 (8.7)	2 (1.7)								115 (100.0)	1	38	154
4～ (%)	405 (87.7)	46 (10.0)	7 (1.5)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)	1 (0.2)				462 (100.0)	5	108	575
6～ (%)	785 (85.4)	107 (11.6)	19 (2.1)	7 (0.8)	1 (0.1)						919 (100.0)	4	210	1,133
8～ (%)	940 (85.5)	125 (11.4)	24 (2.2)	8 (0.7)	2 (0.2)				1 (0.1)		1,100 (100.0)	5	244	1,349
10～ (%)	826 (90.2)	74 (8.1)	11 (1.2)	2 (0.2)	1 (0.1)	1 (0.1)				1 (0.1)	916 (100.0)	10	189	1,115
12～ (%)	593 (89.4)	61 (9.2)	3 (0.5)	2 (0.3)	2 (0.3)	2 (0.3)					663 (100.0)	9	176	848
14～ (%)	359 (91.1)	29 (7.4)	4 (1.0)	2 (0.5)							394 (100.0)	5	89	488
16～ (%)	194 (90.7)	16 (7.5)	2 (0.9)	2 (0.9)							214 (100.0)	4	77	295
合計 (%)	4,216 (87.9)	468 (9.8)	72 (1.5)	24 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	4,794 (100.0)	43	1,137	5,974
記載なし (%)	435 (85.8)	59 (11.6)	10 (2.0)	3 (0.6)							507 (100.0)	36	2,424	2,967
総計 (%)	4,651 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,301 (100.0)	79	3,561	8,941
平均	9.90	9.52	8.88	10.02	9.31	10.42	5.90		8.40	11.40	9.85	10.97	10.01	9.89
標準偏差	3.46	3.36	3.04	3.81	2.84	4.16					3.44	3.76	3.85	3.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査