

表 4450 腹膜炎罹患回数(回/年) ヘモグロビン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

ヘモグロビン 濃度	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
5未満 (%)	7 (100.0)										7 (100.0)			7
5～ (%)	10 (83.3)	2 (16.7)									12 (100.0)	1	1	14
6～ (%)	17 (81.0)	4 (19.0)									21 (100.0)	1	6	28
7～ (%)	71 (82.6)	11 (12.8)	3 (3.5)		1 (1.2)						86 (100.0)	3	35	124
8～ (%)	204 (81.6)	32 (12.8)	6 (2.4)	5 (2.0)	3 (1.2)						250 (100.0)	6	88	344
9～ (%)	618 (87.3)	76 (10.7)	8 (1.1)	3 (0.4)	1 (0.1)	2 (0.3)					708 (100.0)	11	184	903
10～ (%)	1,205 (88.0)	128 (9.3)	30 (2.2)	5 (0.4)		1 (0.1)			1 (0.1)		1,370 (100.0)	10	326	1,706
11～ (%)	1,262 (88.8)	133 (9.4)	16 (1.1)	7 (0.5)	1 (0.1)		1 (0.1)			1 (0.1)	1,421 (100.0)	7	281	1,709
12～ (%)	568 (90.0)	55 (8.7)	4 (0.6)	3 (0.5)	1 (0.2)						631 (100.0)	4	161	796
13～ (%)	175 (90.2)	13 (6.7)	4 (2.1)	1 (0.5)		1 (0.5)					194 (100.0)	1	42	237
14～ (%)	54 (90.0)	6 (10.0)									60 (100.0)		19	79
合計 (%)	4,191 (88.0)	460 (9.7)	71 (1.5)	24 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	4,760 (100.0)	44	1,143	5,947
記載なし (%)	460 (85.0)	67 (12.4)	11 (2.0)	3 (0.6)							541 (100.0)	35	2,418	2,994
総計 (%)	4,651 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,301 (100.0)	79	3,561	8,941
平均	10.87	10.67	10.52	10.54	9.49	10.73	11.40		10.50	11.70	10.84	10.05	10.72	10.81
標準偏差	1.39	1.43	1.35	1.49	1.73	1.91					1.40	1.60	1.47	1.42

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査