

表 4454 腹膜炎罹患回数(回/年) 収縮期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

収縮期血圧	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
60未満 (%)	1 (100.0)										1 (100.0)			1
60～ (%)	10 (83.3)		1 (8.3)				1 (8.3)				12 (100.0)		1	13
80～ (%)	87 (83.7)	15 (14.4)	1 (1.0)	1 (1.0)							104 (100.0)		20	124
100～ (%)	481 (86.8)	63 (11.4)	7 (1.3)	2 (0.4)	1 (0.2)						554 (100.0)	3	84	641
120～ (%)	1,172 (88.5)	122 (9.2)	20 (1.5)	7 (0.5)	3 (0.2)	1 (0.1)					1,325 (100.0)	4	187	1,516
140～ (%)	1,197 (87.2)	138 (10.1)	26 (1.9)	6 (0.4)	2 (0.1)	2 (0.1)			1 (0.1)	1 (0.1)	1,373 (100.0)	5	201	1,579
160～ (%)	533 (88.0)	60 (9.9)	9 (1.5)	4 (0.7)							606 (100.0)	6	109	721
180～ (%)	164 (87.2)	20 (10.6)	4 (2.1)								188 (100.0)	2	27	217
200～ (%)	22 (100.0)										22 (100.0)	1	8	31
220～ (%)	6 (85.7)	1 (14.3)									7 (100.0)		3	10
合計 (%)	3,673 (87.6)	419 (10.0)	68 (1.6)	20 (0.5)	6 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	4,192 (100.0)	21	640	4,853
記載なし (%)	978 (88.2)	108 (9.7)	14 (1.3)	7 (0.6)	1 (0.1)	1 (0.1)					1,109 (100.0)	58	2,921	4,088
総計 (%)	4,651 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,301 (100.0)	79	3,561	8,941
平均	140.80	140.16	141.35	140.40	136.33	146.00	76.00		155.00	158.00	140.73	152.62	142.46	141.01
標準偏差	22.60	23.15	23.36	22.58	15.71	6.24					22.66	30.20	23.88	22.88

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査