

表 4462 腹膜炎罹患回数(回/年) APD使用の有無別 (腹膜透析患者)

APD使用の有無	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	2,435 (53.5)	290 (56.9)	46 (58.2)	19 (73.1)	3 (42.9)	1 (25.0)	1 (100.0)			1 (100.0)	2,796 (54.0)	4 (40.0)	156 (56.9)	2,956 (54.1)
あり (%)	2,118 (46.5)	220 (43.1)	33 (41.8)	7 (26.9)	4 (57.1)	3 (75.0)			1 (100.0)	2,386 (46.0)	6 (60.0)	118 (43.1)	2,510 (45.9)	
合計 (%)	4,553 (100.0)	510 (100.0)	79 (100.0)	26 (100.0)	7 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)		1 (100.0)	5,182 (100.0)	10 (100.0)	274 (100.0)	5,466 (100.0)	
不明	14	2									16	17	2	35
記載なし	84	15	3	1							103	52	3,285	3,440
総計	4,651	527	82	27	7	4	1		1	5,301	79	3,561	8,941	

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査