

表 4464 腹膜炎罹患回数(回/年) PD透析液交換方法別(腹膜透析患者)

PD透析液交換方法	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
完全手動式	1,501	155	21	10	2	1			1	1	1,692	2	66	1,760
(%)	(88.7)	(9.2)	(1.2)	(0.6)	(0.1)	(0.1)			(0.1)	(0.1)	(100.0)			
バッグ交換デバイス(紫外線)	2,409	270	42	11	4	2					2,738	6	131	2,875
(%)	(88.0)	(9.9)	(1.5)	(0.4)	(0.1)	(0.1)					(100.0)			
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	586	79	18	5	1	1					690		27	717
(%)	(84.9)	(11.4)	(2.6)	(0.7)	(0.1)	(0.1)					(100.0)			
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	65	6	1	1			1				74	1	5	80
(%)	(87.8)	(8.1)	(1.4)	(1.4)			(1.4)				(100.0)			
合計	4,561	510	82	27	7	4	1		1	1	5,194	9	229	5,432
(%)	(87.8)	(9.8)	(1.6)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(0.0)		(0.0)	(0.0)	(100.0)			
不明	33	4									37	70		107
(%)	(89.2)	(10.8)									(100.0)			
記載なし	57	13									70		3,332	3,402
(%)	(81.4)	(18.6)									(100.0)			
総計	4,651	527	82	27	7	4	1		1	1	5,301	79	3,561	8,941
(%)	(87.7)	(9.9)	(1.5)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(0.0)		(0.0)	(0.0)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査