

表 4466 腹膜炎罹患回数(回/年) 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別 (腹膜透析患者)

2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
0 (%)	3,791 (89.1)	384 (9.0)	52 (1.2)	23 (0.5)	3 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)				4,257 (100.0)		3	4,260
1.0～ (%)	504 (81.4)	94 (15.2)	18 (2.9)	2 (0.3)	1 (0.2)						619 (100.0)		1	620
2.0～ (%)	166 (86.5)	21 (10.9)	3 (1.6)	1 (0.5)		1 (0.5)					192 (100.0)			192
3.0～ (%)	63 (87.5)	5 (6.9)	3 (4.2)						1 (1.4)		72 (100.0)			72
4.0～ (%)	40 (83.3)	6 (12.5)	1 (2.1)		1 (2.1)						48 (100.0)			48
5.0～ (%)	68 (78.2)	13 (14.9)	4 (4.6)		1 (1.1)					1 (1.1)	87 (100.0)	1	1	89
合計 (%)	4,632 (87.8)	523 (9.9)	81 (1.5)	26 (0.5)	6 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,275 (100.0)	1	5	5,281
不明記載なし (%)	19 (73.1)	4 (15.4)	1 (3.8)	1 (3.8)	1 (3.8)						26 (100.0)	78	3,556	3,660
総計 (%)	4,651 (87.7)	527 (9.9)	82 (1.5)	27 (0.5)	7 (0.1)	4 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)	1 (0.0)	5,301 (100.0)	79	3,561	8,941
平均	0.37	0.52	0.85	0.20	1.69	0.50			3.00	5.00	0.40	6.00	2.62	0.40
標準偏差	1.13	1.29	1.83	0.58	2.29	1.00					1.16		5.27	1.18

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査