

表 4468 腹膜炎罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析単独患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,060 (87.0)	251 (10.6)	40 (1.7)	14 (0.6)	2 (0.1)	1 (0.0)	1 (0.0)				2,369 (100.0)	37	1,726	4,132
腹膜透析 (APD) (%)	1,270 (88.4)	136 (9.5)	18 (1.3)	7 (0.5)	3 (0.2)	2 (0.1)		1 (0.1)			1,437 (100.0)	19	880	2,336
腹膜透析 (CCPD) (%)	428 (86.5)	53 (10.7)	12 (2.4)	1 (0.2)	1 (0.2)						495 (100.0)	4	221	720
合計 (%)	3,758 (87.4)	440 (10.2)	70 (1.6)	22 (0.5)	6 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)		4,301 (100.0)	60	2,827	7,188
記載なし (%)														
総計 (%)	3,758 (87.4)	440 (10.2)	70 (1.6)	22 (0.5)	6 (0.1)	3 (0.1)	1 (0.0)		1 (0.0)		4,301 (100.0)	60	2,827	7,188

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査