

表 4480 腹膜炎罹患回数(回/年) APD使用の有無別 (腹膜透析単独患者)

APD使用の有無	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	2,001 (54.3)	246 (57.2)	38 (55.9)	14 (66.7)	2 (33.3)	1 (33.3)	1 (100.0)				2,303 (54.7)	4 (50.0)	131 (58.0)	2,438 (54.8)
あり (%)	1,681 (45.7)	184 (42.8)	30 (44.1)	7 (33.3)	4 (66.7)	2 (66.7)			1 (100.0)		1,909 (45.3)	4 (50.0)	95 (42.0)	2,008 (45.2)
合計 (%)	3,682 (100.0)	430 (100.0)	68 (100.0)	21 (100.0)	6 (100.0)	3 (100.0)	1 (100.0)		1 (100.0)		4,212 (100.0)	8 (100.0)	226 (100.0)	4,446 (100.0)
不明	12	1									13	15	2	30
記載なし	64	9	2	1							76	37	2,599	2,712
総計	3,758	440	70	22	6	3	1		1		4,301	60	2,827	7,188

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査