

表 4484 腹膜炎罹患回数(回/年) 2014年中の出口部感染発症率(回/1患者・年)別(腹膜透析単独患者)

2014年中の出口 部感染発症率 (回/1患者・年)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
0	3,078	318	42	18	3	2	1				3,462		3	3,465
(%)	(88.9)	(9.2)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(0.0)				(100.0)			
1.0～	391	84	16	2	1						494		1	495
(%)	(79.1)	(17.0)	(3.2)	(0.4)	(0.2)						(100.0)			
2.0～	138	16	3	1		1					159			159
(%)	(86.8)	(10.1)	(1.9)	(0.6)		(0.6)					(100.0)			
3.0～	50	4	3						1		58			58
(%)	(86.2)	(6.9)	(5.2)						(1.7)		(100.0)			
4.0～	33	5	1		1						40			40
(%)	(82.5)	(12.5)	(2.5)		(2.5)						(100.0)			
5.0～	56	9	4		1						70	1	1	72
(%)	(80.0)	(12.9)	(5.7)		(1.4)						(100.0)			
合計	3,746	436	69	21	6	3	1		1		4,283	1	5	4,289
(%)	(87.5)	(10.2)	(1.6)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(0.0)		(0.0)		(100.0)			
不明	12	4	1	1							18	59	2,822	2,899
記載なし	(66.7)	(22.2)	(5.6)	(5.6)							(100.0)			
(%)														
総計	3,758	440	70	22	6	3	1		1		4,301	60	2,827	7,188
(%)	(87.4)	(10.2)	(1.6)	(0.5)	(0.1)	(0.1)	(0.0)		(0.0)		(100.0)			
平均	0.38	0.49	0.97	0.25	1.69	0.67			3.00		0.40	6.00	2.62	0.40
標準偏差	1.17	1.21	1.95	0.64	2.29	1.15					1.19		5.27	1.21

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。
個々の患者の出口部感染発症率(回/1患者・年)は、1.0未満の数値が0となるため、「0」と表示しています。
(C)Japanese Society for Dialysis Therapy
2014年調査