

表 4486 腹膜炎罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (PD・HD(F)等併用患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	442 (87.2)	50 (9.9)	8 (1.6)	5 (1.0)	1 (0.2)					1 (0.2)	507 (100.0)	6	376	889
腹膜透析 (APD) (%)	249 (92.2)	19 (7.0)	1 (0.4)			1 (0.4)					270 (100.0)	11	220	501
腹膜透析 (CCPD) (%)	199 (90.5)	18 (8.2)	3 (1.4)								220 (100.0)	2	136	358
合計 (%)	890 (89.3)	87 (8.7)	12 (1.2)	5 (0.5)	1 (0.1)	1 (0.1)				1 (0.1)	997 (100.0)	19	732	1,748
記載なし (%)														
総計 (%)	890 (89.3)	87 (8.7)	12 (1.2)	5 (0.5)	1 (0.1)	1 (0.1)				1 (0.1)	997 (100.0)	19	732	1,748

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査