

表 4489 腹膜炎罹患回数(回/年) 年齢(歳)別 (PD・HD(F)等併用患者)

| 年齢 | なし | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回以上 | 合計 | 不明 | 記載なし | 総計 |
|--------------|---------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|----|----|------------|----------------|-------|-------|-------|
| 15歳未満 (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 15歳～ (%) | 10 (100.0) | | | | | | | | | | 10 (100.0) | | 9 | 19 |
| 30歳～ (%) | 95 (96.0) | 3 (3.0) | | | | | 1 (1.0) | | | | 99 (100.0) | 1 | 76 | 176 |
| 45歳～ (%) | 305 (90.5) | 28 (8.3) | 4 (1.2) | | | | | | | | 337 (100.0) | 8 | 276 | 621 |
| 60歳～ (%) | 402 (88.2) | 44 (9.6) | 5 (1.1) | 3 (0.7) | 1 (0.2) | | | | | 1 (0.2) | 456 (100.0) | 10 | 333 | 799 |
| 75歳～ (%) | 75 (81.5) | 12 (13.0) | 3 (3.3) | 2 (2.2) | | | | | | | 92 (100.0) | | 38 | 130 |
| 90歳～ (%) | 3 (100.0) | | | | | | | | | | 3 (100.0) | | | 3 |
| 合計 (%) | 890 (89.3) | 87 (8.7) | 12 (1.2) | 5 (0.5) | 1 (0.1) | 1 (0.1) | | | | 1 (0.1) | 997 (100.0) | 19 | 732 | 1,748 |
| 不明 (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 記載なし (%) | | | | | | | | | | | | | | |
| 総計 (%) | 890 (89.3) | 87 (8.7) | 12 (1.2) | 5 (0.5) | 1 (0.1) | 1 (0.1) | | | | 1 (0.1) | 997 (100.0) | 19 | 732 | 1,748 |
| 平均 | 59.39 | 61.92 | 64.67 | 68.80 | 65.00 | 40.00 | | | | 64.00 | 59.71 | 60.16 | 58.33 | 59.14 |
| 標準偏差 | 11.88 | 10.56 | 12.55 | 9.55 | | | | | | | 11.81 | 8.80 | 11.28 | 11.58 |

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査