

表 4495 腹膜炎罹患回数(回/年) 使用透析液の種類別 (PD・HD(F)等併用患者)

使用透析液の種類	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
1.5%液のみ	148	21	3								172	2	10	184
(%)	(86.0)	(12.2)	(1.7)								(100.0)			
1.5%液と2.5%液の併用	190	14	2	2							208	2	11	221
(%)	(91.3)	(6.7)	(1.0)	(1.0)							(100.0)			
2.5%液のみ	40	4	2	1							47		4	51
(%)	(85.1)	(8.5)	(4.3)	(2.1)							(100.0)			
4.25%液のみ(イコデキストリンなし)	1										1			1
(%)	(100.0)										(100.0)			
イコデキストリン単独(ブドウ糖使用なし)	6										6			6
(%)	(100.0)										(100.0)			
1.5%+イコデキストリン	184	23	2		1	1					212		5	217
(%)	(86.8)	(10.8)	(0.9)		(0.5)	(0.5)					(100.0)			
1.5%+2.5%+イコデキストリン	171	10	3	1							185		8	193
(%)	(92.4)	(5.4)	(1.6)	(0.5)							(100.0)			
2.5%+イコデキストリン	122	13		1							136		9	145
(%)	(89.7)	(9.6)		(0.7)							(100.0)			
4.25%液+イコデキストリン	3										3			3
(%)	(100.0)										(100.0)			
合計	865	85	12	5	1	1				1	970	4	47	1,021
(%)	(89.2)	(8.8)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)				(0.1)	(100.0)			
不明	2										2		15	17
(%)	(100.0)										(100.0)			
記載なし	23	2									25		685	710
(%)	(92.0)	(8.0)									(100.0)			
総計	890	87	12	5	1	1				1	997	19	732	1,748
(%)	(89.3)	(8.7)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)				(0.1)	(100.0)			

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査