

表 4501 腹膜炎罹患回数(回/年) PD透析液交換方法別 (PD・HD(F)等併用患者)

PD透析液交換方法	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
完全手動式	285	31	5	3						1	325	1	12	338
(%)	(87.7)	(9.5)	(1.5)	(0.9)						(0.3)	(100.0)			
バッグ交換デバイス(紫外線)	485	41	2	2	1	1					532		18	550
(%)	(91.2)	(7.7)	(0.4)	(0.4)	(0.2)	(0.2)					(100.0)			
バッグ交換デバイス(熱式無菌接合装置)	88	7	4								99		11	110
(%)	(88.9)	(7.1)	(4.0)								(100.0)			
バッグ交換デバイス(左記以外、半手動も含む)	11	1	1								13		1	14
(%)	(84.6)	(7.7)	(7.7)								(100.0)			
合計	869	80	12	5	1	1				1	969	1	42	1,012
(%)	(89.7)	(8.3)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)				(0.1)	(100.0)			
不明	12	1									13	18		31
(%)	(92.3)	(7.7)									(100.0)			
記載なし	9	6									15		690	705
(%)	(60.0)	(40.0)									(100.0)			
総計	890	87	12	5	1	1				1	997	19	732	1,748
(%)	(89.3)	(8.7)	(1.2)	(0.5)	(0.1)	(0.1)				(0.1)	(100.0)			

数値下の括弧内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査