

表 4505 出口部感染罹患回数(回/年) 治療方法(新分類)別 (腹膜透析患者)

治療方法 (新分類)	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
腹膜透析 (CAPD) (%)	2,337 (81.5)	377 (13.1)	89 (3.1)	27 (0.9)	11 (0.4)	13 (0.5)	8 (0.3)		1 (0.0)	6 (0.2)	2,869 (100.0)	45	2,107	5,021
腹膜透析 (APD) (%)	1,349 (79.4)	222 (13.1)	65 (3.8)	25 (1.5)	17 (1.0)	5 (0.3)	6 (0.4)		1 (0.1)	8 (0.5)	1,698 (100.0)	30	1,111	2,839
腹膜透析 (CCPD) (%)	574 (80.4)	97 (13.6)	29 (4.1)	6 (0.8)	1 (0.1)	3 (0.4)	1 (0.1)		1 (0.1)	2 (0.3)	714 (100.0)	6	361	1,081
合計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
記載なし (%)														
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

*腹膜透析(CCPD)は、APDと手動のバック交換の両方を行うもの

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査