

表 4506 出口部感染罹患回数(回/年) 併用の状況別 (腹膜透析患者)

併用の状況	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計	
HD(F)単独 (%)															
PD単独 (%)	3,465 (80.8)	565 (13.2)	150 (3.5)	45 (1.0)	24 (0.6)	13 (0.3)	12 (0.3)			1 (0.0)	14 (0.3)	4,289 (100.0)	61	2,838	7,188
HD(F)単独.PDカテ あり (%)															
PD.HD併用週1 HD(F) (%)	673 (79.8)	110 (13.0)	28 (3.3)	12 (1.4)	5 (0.6)	8 (0.9)	3 (0.4)			2 (0.2)	2 (0.2)	843 (100.0)	20	681	1,544
PD.HD併用週2 HD(F) (%)	78 (77.2)	19 (18.8)	3 (3.0)	1 (1.0)								101 (100.0)		40	141
PD.HD併用週3 HD(F) (%)															
PD.HD併用週4 HD(F) (%)															
PD.HD併用その他 (%)	42 (93.3)	1 (2.2)	2 (4.4)								45 (100.0)		18	63	
合計 (%)	4,258 (80.7)	695 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)			3 (0.1)	16 (0.3)	5,278 (100.0)	81	3,577	8,936
不明 (%)	2 (66.7)	1 (33.3)										3 (100.0)		2	5
記載なし (%)															
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)			3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査