

表 4508 出口部感染罹患回数(回/年) 年齢(歳)別 (腹膜透析患者)

年齢	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
15歳未満 (%)	40 (80.0)	6 (12.0)	3 (6.0)	1 (2.0)							50 (100.0)		47	97
15歳～ (%)	55 (80.9)	7 (10.3)	3 (4.4)	1 (1.5)	1 (1.5)					1 (1.5)	68 (100.0)	2	41	111
30歳～ (%)	343 (82.7)	47 (11.3)	14 (3.4)	5 (1.2)	1 (0.2)	4 (1.0)	1 (0.2)				415 (100.0)	3	283	701
45歳～ (%)	1,077 (79.5)	192 (14.2)	50 (3.7)	13 (1.0)	7 (0.5)	6 (0.4)	3 (0.2)			7 (0.5)	1,355 (100.0)	23	924	2,302
60歳～ (%)	1,947 (81.4)	304 (12.7)	78 (3.3)	25 (1.0)	12 (0.5)	7 (0.3)	10 (0.4)		3 (0.1)	5 (0.2)	2,391 (100.0)	39	1,604	4,034
75歳～ (%)	751 (80.0)	129 (13.7)	32 (3.4)	13 (1.4)	7 (0.7)	3 (0.3)	1 (0.1)			3 (0.3)	939 (100.0)	13	639	1,591
90歳～ (%)	47 (74.6)	11 (17.5)	3 (4.8)		1 (1.6)	1 (1.6)					63 (100.0)	1	41	105
合計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
不明 (%)														
記載なし (%)														
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
平均	62.42	62.85	62.39	63.50	66.34	60.14	63.80		63.67	59.31	62.49	62.85	62.37	62.45
標準偏差	14.39	14.11	15.59	15.20	14.10	16.37	10.37		3.51	12.97	14.39	12.91	14.78	14.53

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査