

表 4518 出口部感染罹患回数(回/年) 大腿骨頸部骨折の既往別(腹膜透析患者)

大腿骨頸部骨折の既往	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
既往なし (%)	3,686 (98.0)	623 (98.3)	169 (98.8)	56 (100.0)	24 (96.0)	21 (100.0)	14 (100.0)		3 (100.0)	16 (100.0)	4,612 (98.1)	52 (98.1)	1,067 (96.0)	5,731 (97.7)
既往あり (%)	75 (2.0)	11 (1.7)	2 (1.2)		1 (4.0)						89 (1.9)	1 (1.9)	44 (4.0)	134 (2.3)
合計 (%)	3,761 (100.0)	634 (100.0)	171 (100.0)	56 (100.0)	25 (100.0)	21 (100.0)	14 (100.0)		3 (100.0)	16 (100.0)	4,701 (100.0)	53 (100.0)	1,111 (100.0)	5,865 (100.0)
不明	37	2									39	1	15	55
記載なし	462	60	12	2	4		1				541	27	2,453	3,021
総計	4,260	696	183	58	29	21	15		3	16	5,281	81	3,579	8,941

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査