

表 4519 出口部感染罹患回数(回/年) 降圧薬使用の有無別（腹膜透析患者）

降圧薬使用の有無	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
なし	826	140	34	9	1	5	1			1	1,017	12	258	1,287
(%)	(20.6)	(21.7)	(19.4)	(16.1)	(3.8)	(23.8)	(7.1)			(6.7)	(20.5)	(46.2)	(21.6)	(20.8)
あり	3,176	506	141	47	25	16	13		3	14	3,941	14	937	4,892
(%)	(79.4)	(78.3)	(80.6)	(83.9)	(96.2)	(76.2)	(92.9)		(100.0)	(93.3)	(79.5)	(53.8)	(78.4)	(79.2)
合計	4,002	646	175	56	26	21	14		3	15	4,958	26	1,195	6,179
(%)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)		(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)	(100.0)
不明	25	5									30	27	14	71
記載なし	233	45	8	2	3		1			1	293	28	2,370	2,691
総計	4,260	696	183	58	29	21	15		3	16	5,281	81	3,579	8,941

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する％です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査