

表 4527 出口部感染罹患回数(回/年) アルブミン濃度(g/dL)別 (腹膜透析患者)

アルブミン濃度	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
1.5未満 (%)	10 (100.0)										10 (100.0)		5	15
1.5～ (%)	40 (76.9)	10 (19.2)		2 (3.8)							52 (100.0)		19	71
2.0～ (%)	176 (80.4)	29 (13.2)	8 (3.7)	2 (0.9)	2 (0.9)	2 (0.9)					219 (100.0)	3	76	298
2.5～ (%)	660 (81.9)	90 (11.2)	32 (4.0)	7 (0.9)	8 (1.0)	2 (0.2)	4 (0.5)			3 (0.4)	806 (100.0)	5	226	1,037
3.0～ (%)	1,402 (81.1)	226 (13.1)	58 (3.4)	18 (1.0)	7 (0.4)	9 (0.5)	4 (0.2)		2 (0.1)	3 (0.2)	1,729 (100.0)	14	415	2,158
3.5～ (%)	1,279 (81.8)	184 (11.8)	54 (3.5)	20 (1.3)	8 (0.5)	8 (0.5)	5 (0.3)			6 (0.4)	1,564 (100.0)	15	327	1,906
4.0～ (%)	271 (78.3)	54 (15.6)	11 (3.2)	4 (1.2)	2 (0.6)		1 (0.3)		1 (0.3)	2 (0.6)	346 (100.0)	7	78	431
4.5～ (%)	11 (78.6)	3 (21.4)									14 (100.0)		7	21
5.0～ (%)	1 (100.0)										1 (100.0)		1	2
合計 (%)	3,850 (81.2)	596 (12.6)	163 (3.4)	53 (1.1)	27 (0.6)	21 (0.4)	14 (0.3)		3 (0.1)	14 (0.3)	4,741 (100.0)	44	1,154	5,939
記載なし (%)	410 (75.9)	100 (18.5)	20 (3.7)	5 (0.9)	2 (0.4)		1 (0.2)			2 (0.4)	540 (100.0)	37	2,425	3,002
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
平均	3.29	3.30	3.29	3.28	3.20	3.23	3.33		3.50	3.44	3.29	3.40	3.21	3.28
標準偏差	0.51	0.52	0.47	0.54	0.53	0.47	0.43		0.46	0.47	0.51	0.56	0.55	0.52

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査