

表 4529 出口部感染罹患回数(回/年) 補正カルシウム濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

補正 カルシウム濃度	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
7.0未満 (%)	20 (87.0)	2 (8.7)	1 (4.3)								23 (100.0)		6	29
7.0～ (%)	22 (84.6)	2 (7.7)	1 (3.8)		1 (3.8)						26 (100.0)		10	36
7.5～ (%)	81 (88.0)	5 (5.4)	2 (2.2)	1 (1.1)		1 (1.1)	2 (2.2)				92 (100.0)		35	127
8.0～ (%)	184 (85.2)	26 (12.0)	3 (1.4)	2 (0.9)						1 (0.5)	216 (100.0)	2	68	286
8.4～ (%)	51 (78.5)	9 (13.8)	2 (3.1)	2 (3.1)					1 (1.5)		65 (100.0)		21	86
8.5～ (%)	600 (82.2)	82 (11.2)	25 (3.4)	5 (0.7)	6 (0.8)	2 (0.3)	5 (0.7)		1 (0.1)	4 (0.5)	730 (100.0)	6	170	906
9.0～ (%)	1,047 (80.4)	166 (12.7)	51 (3.9)	16 (1.2)	5 (0.4)	9 (0.7)	3 (0.2)		1 (0.1)	4 (0.3)	1,302 (100.0)	8	292	1,602
9.5～ (%)	1,066 (80.6)	173 (13.1)	48 (3.6)	13 (1.0)	11 (0.8)	4 (0.3)	4 (0.3)			4 (0.3)	1,323 (100.0)	16	290	1,629
10.0～ (%)	132 (84.1)	16 (10.2)	5 (3.2)	1 (0.6)	1 (0.6)	1 (0.6)				1 (0.6)	157 (100.0)		34	191
10.1～ (%)	367 (79.8)	67 (14.6)	14 (3.0)	8 (1.7)	3 (0.7)	1 (0.2)					460 (100.0)	5	92	557
10.5～ (%)	174 (79.1)	32 (14.5)	9 (4.1)	3 (1.4)		2 (0.9)					220 (100.0)	3	73	296
11.0～ (%)	62 (82.7)	10 (13.3)		2 (2.7)		1 (1.3)					75 (100.0)	2	34	111
11.5～ (%)	16 (80.0)	4 (20.0)									20 (100.0)	1	8	29
12.0～ (%)	12 (75.0)	2 (12.5)	2 (12.5)								16 (100.0)	1	10	27
合計 (%)	3,834 (81.1)	596 (12.6)	163 (3.4)	53 (1.1)	27 (0.6)	21 (0.4)	14 (0.3)		3 (0.1)	14 (0.3)	4,725 (100.0)	44	1,143	5,912
記載なし (%)	426 (76.6)	100 (18.0)	20 (3.6)	5 (0.9)	2 (0.4)		1 (0.2)			2 (0.4)	556 (100.0)	37	2,436	3,029
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
平均	9.39	9.46	9.42	9.52	9.40	9.50	8.91		8.73	9.17	9.40	9.73	9.41	9.41
標準偏差	0.78	0.75	0.80	0.77	0.65	0.74	0.72		0.49	0.51	0.78	0.87	0.87	0.80

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査