

表 4535 出口部感染罹患回数(回/年) HDL-C濃度(mg/dL)別 (腹膜透析患者)

HDL-C濃度	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	6 (100.0)										6 (100.0)		2	8
20～ (%)	193 (81.1)	31 (13.0)	7 (2.9)	4 (1.7)	1 (0.4)		2 (0.8)				238 (100.0)	3	47	288
30～ (%)	632 (80.9)	104 (13.3)	28 (3.6)	4 (0.5)	4 (0.5)	6 (0.8)			3 (0.4)		781 (100.0)	6	146	933
40～ (%)	679 (79.8)	114 (13.4)	31 (3.6)	10 (1.2)	6 (0.7)	4 (0.5)	1 (0.1)			6 (0.7)	851 (100.0)	4	135	990
50～ (%)	586 (81.1)	88 (12.2)	30 (4.1)	8 (1.1)	4 (0.6)	2 (0.3)	2 (0.3)			3 (0.4)	723 (100.0)	6	110	839
60～ (%)	377 (84.9)	46 (10.4)	8 (1.8)	6 (1.4)	2 (0.5)	2 (0.5)	2 (0.5)			1 (0.2)	444 (100.0)	2	70	516
70～ (%)	178 (79.5)	33 (14.7)	7 (3.1)	4 (1.8)		1 (0.4)	1 (0.4)				224 (100.0)	1	34	259
80～ (%)	97 (82.2)	11 (9.3)	6 (5.1)	3 (2.5)		1 (0.8)					118 (100.0)		23	141
90～ (%)	45 (83.3)	6 (11.1)	3 (5.6)								54 (100.0)		7	61
100～ (%)	41 (80.4)	8 (15.7)	2 (3.9)								51 (100.0)		6	57
合計 (%)	2,834 (81.2)	441 (12.6)	122 (3.5)	39 (1.1)	17 (0.5)	16 (0.5)	8 (0.2)		3 (0.1)	10 (0.3)	3,490 (100.0)	22	580	4,092
記載なし (%)	1,426 (79.6)	255 (14.2)	61 (3.4)	19 (1.1)	12 (0.7)	5 (0.3)	7 (0.4)			6 (0.3)	1,791 (100.0)	59	2,999	4,849
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
平均	50.79	50.04	50.98	53.18	45.12	50.44	51.38		34.33	48.30	50.68	45.00	49.45	50.47
標準偏差	17.79	18.13	19.17	17.41	10.98	17.21	18.00		2.31	7.33	17.82	14.29	17.18	17.72

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査