

表 4538 出口部感染罹患回数(回/年) 拡張期血圧(mmHg)別 (腹膜透析患者)

拡張期血圧	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
20未満 (%)	1 (100.0)										1 (100.0)			1
20～ (%)	11 (91.7)		1 (8.3)								12 (100.0)		3	15
40～ (%)	258 (81.6)	40 (12.7)	10 (3.2)	5 (1.6)	1 (0.3)		2 (0.6)				316 (100.0)	1	58	375
60～ (%)	1,476 (82.7)	204 (11.4)	57 (3.2)	23 (1.3)	9 (0.5)	9 (0.5)	4 (0.2)		1 (0.1)	2 (0.1)	1,785 (100.0)	11	269	2,065
80～ (%)	878 (79.5)	149 (13.5)	43 (3.9)	13 (1.2)	10 (0.9)	7 (0.6)	1 (0.1)		1 (0.1)	3 (0.3)	1,105 (100.0)	6	185	1,296
90～ (%)	487 (78.0)	88 (14.1)	31 (5.0)	8 (1.3)	2 (0.3)	2 (0.3)	2 (0.3)		1 (0.2)	3 (0.5)	624 (100.0)	3	87	714
100～ (%)	237 (80.3)	41 (13.9)	6 (2.0)	1 (0.3)	3 (1.0)	2 (0.7)	2 (0.7)			3 (1.0)	295 (100.0)	2	50	347
120～ (%)	14 (87.5)		1 (6.3)	1 (6.3)							16 (100.0)		2	18
140～ (%)	1 (100.0)										1 (100.0)			1
合計 (%)	3,363 (80.9)	522 (12.6)	149 (3.6)	51 (1.2)	25 (0.6)	20 (0.5)	11 (0.3)		3 (0.1)	11 (0.3)	4,155 (100.0)	23	654	4,832
記載なし (%)	897 (79.7)	174 (15.5)	34 (3.0)	7 (0.6)	4 (0.4)	1 (0.1)	4 (0.4)			5 (0.4)	1,126 (100.0)	58	2,925	4,109
総計 (%)	4,260 (80.7)	696 (13.2)	183 (3.5)	58 (1.1)	29 (0.5)	21 (0.4)	15 (0.3)		3 (0.1)	16 (0.3)	5,281 (100.0)	81	3,579	8,941
平均	78.83	79.80	79.38	78.10	80.88	79.65	80.18		82.00	89.91	79.01	80.13	78.97	79.01
標準偏差	14.45	13.96	14.21	14.16	13.43	14.28	16.40		11.53	15.89	14.38	14.60	14.78	14.43

数値下のかっこ内は行方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査