

表 4545 出口部感染罹患回数(回/年) APD使用の有無別（腹膜透析患者）

APD使用の有無	なし	1回	2回	3回	4回	5回	6回	7回	8回	9回以上	合計	不明	記載なし	総計
なし (%)	2,269 (54.5)	365 (53.8)	88 (48.4)	27 (46.6)	11 (37.9)	13 (61.9)	8 (53.3)		1 (33.3)	6 (37.5)	2,788 (54.0)	6 (50.0)	162 (56.3)	2,956 (54.1)
あり (%)	1,895 (45.5)	313 (46.2)	94 (51.6)	31 (53.4)	18 (62.1)	8 (38.1)	7 (46.7)		2 (66.7)	10 (62.5)	2,378 (46.0)	6 (50.0)	126 (43.8)	2,510 (45.9)
合計 (%)	4,164 (100.0)	678 (100.0)	182 (100.0)	58 (100.0)	29 (100.0)	21 (100.0)	15 (100.0)		3 (100.0)	16 (100.0)	5,166 (100.0)	12 (100.0)	288 (100.0)	5,466 (100.0)
不明	13	3									16	17	2	35
記載なし	83	15	1								99	52	3,289	3,440
総計	4,260	696	183	58	29	21	15		3	16	5,281	81	3,579	8,941

数値下のかっこ内は列方向の合計に対する%です。

(C)Japanese Society for Dialysis Therapy

2014年調査